

## برای آزمایش خون بارداری باید ناشتا باشیم؟

آیا برای آزمایش خون بارداری باید ناشتا باشیم؟ پاسخ به این سؤال مهم و متداول منفی است. برخلاف باورهای عمومی، این آزمایش نیازی به ناشتا بودن ندارد. اندازه‌گیری هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) که شاخص اصلی تشخیص بارداری است، تحت تأثیر غذا یا نوشیدنی‌های مصرفی قرار نمی‌گیرد. این ویژگی آزمایش خون بارداری را به یکی از راحت‌ترین و دقیق‌ترین روش‌ها برای تشخیص بارداری تبدیل کرده است.



## برای آزمایش خون بارداری باید ناشتا بود؟

یکی از اصلی‌ترین سؤالات مادران این است که برای آزمایش خون بارداری باید ناشتا باشیم؟ در پاسخ باید گفت خیر، برای آزمایش خون بارداری نیازی به ناشتا بودن نیست. برخلاف برخی آزمایش‌های دیگر که ناشتا بودن ممکن است برای دقت نتیجه حیاتی باشد (مانند آزمایش قند خون یا لیپیدها)، آزمایش خون بارداری برای اندازه‌گیری سطح هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) طراحی شده است و مقدار این هورمون در خون تحت تأثیر غذا یا نوشیدنی مصرفی قرار نمی‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود که شما بتوانید این آزمایش را در هر زمانی از روز انجام بدهید، بدون نیاز به محدودیت‌های غذایی یا زمانی. با این حال، برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر، توصیه می‌شود از مصرف الکل، سیگار یا داروهایی که ممکن است بر نتیجه آزمایش تأثیر بگذارند، اجتناب کنید.

در این راستا، خدمات آزمایش در منزل مانند آنچه توسط پارا درمان ارائه می‌شود، می‌تواند انجام این تست را برای شما راحت‌تر کند. با این خدمات، بدون نیاز به مراجعه حضوری، نمونه‌گیری در منزل انجام می‌شود و نتیجه آزمایش به سرعت به دستتان خواهد رسید.

# انواع خدمات آزمایش در منزل

## آزمایش ادرار در منزل

آزمایش ادرار جهت بررسی عفونت ادراری ، بیماری های کلیوی و همچنین دیابت کاربرد دارد

## آزمایش خون در منزل

آزمایش قند خون، آزمایش چربی خون، آزمایش تیروئید، آزمایش کبد و کلیه، آزمایش عفونت ها و آزمایش های مربوط به کم خونی

## آزمایش مدفوع در منزل

آزمایش مدفوع جهت بررسی بیماری های مختلفی مانند خون ریزی و عفونت گوارشی ( باکتری ، ویروس ، انگل و ... ) انجام می شود و در آن مدفوع از نظر رنگ ، شکل ، قوام ، وجود گلبول سفید و باکتری و ... بررسی می شود



بعد از تماس شما با مرکز درمان در منزل یارا درمان، توضیحات لازم در خصوص آمادگی قبل از آزمایش به شما ارائه می شود. زمان نمونه گیری با شما هماهنگ می شود. سپس کارشناس پرستاری یا کارشناس علوم آزمایشگاهی با وسایل و تجهیزات لازم برای نمونه گیری به منزل شما مراجعه می کند. نمونه گیری در منزل انجام می شود. کارشناس نمونه را به نزدیک ترین آزمایشگاه همکار ارائه می دهد. بعد از اعلام نتیجه ی آزمایش، آن را برای بیمار ارسال می کند.

## بهترین زمان برای انجام آزمایش خون

بهترین زمان برای انجام آزمایش خون بارداری زمانی است که سطح هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG) در خون به اندازه کافی بالا باشد تا به وضوح قابل تشخیص باشد. این زمان معمولاً 7 تا 12 روز پس از لقاح است؛ یعنی پیش از موعد قاعدگی بعدی. در این مرحله، تخمک بارور شده به دیواره رحم متصل و تولید هورمون hCG آغاز شده است. اگر آزمایش خیلی زود انجام شود، ممکن است نتیجه به اشتباه منفی گزارش شود زیرا سطح هورمون هنوز به آستانه قابل تشخیص نرسیده است.

اگر چرخه قاعدگی منظم دارید و قاعدگی شما به تعویق افتاده است، انجام آزمایش یک یا دو روز پس از عقب افتادن قاعدگی ایدئال است. برای افرادی که چرخه های قاعدگی نامنظم دارند، بهتر است از اولین نشانه های بارداری مانند تهوع صبحگاهی، خستگی یا حساسیت پستان ها توجه کنند و سپس آزمایش را انجام بدهند. همچنین در مواردی که نتیجه آزمایش منفی است اما همچنان علائم بارداری وجود دارد، پزشکان توصیه می کنند که آزمایش حدود یک هفته بعد تکرار شود.

آزمایشگاه نوبل در این باره گفته است:

بهترین زمان برای انجام آزمایش ادرار بارداری یک هفته پس از پرئود از دست رفته است. البته در خصوص آزمایش خون می‌توان زودتر از موعد ذکر شده اقدام کرد زیرا حساسیت و دقت آزمایش خون بالاتر است.

آزمایش خون، به‌ویژه نوع کمی hCG، حتی مقادیر بسیار کم این هورمون را نیز تشخیص می‌دهد و در مقایسه با آزمایش ادرار بارداری، زودتر و دقیق‌تر نتیجه می‌دهد. این ویژگی آن را به گزینه‌ای مناسب برای تشخیص سریع و دقیق بارداری تبدیل کرده است.

به نقل از سایت [my.clevelandclinic.org](http://my.clevelandclinic.org) درباره زمان طلایی این آزمایش:

These blood tests are slightly more sensitive than urine tests because they can detect very small levels of HCG. That means they can provide a more accurate answer very early on in pregnancy — within seven to 10 days after conception

این آزمایش‌های خون کمی حساس‌تر از آزمایش‌های ادرار هستند، زیرا می‌توانند سطوح بسیار کمی از HCG را تشخیص دهند. این بدان معناست که آنها می‌توانند در اوایل بارداری - در عرض هفت تا 10 روز پس از لقاح - پاسخ دقیق‌تری ارائه دهند.



### سخن پایانی

برای آزمایش خون بارداری باید ناشتا باشیم؟ پاسخ این سوال در بیشتر موارد منفی است. این آزمایش یکی از دقیق‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای تشخیص بارداری است و نیازی به ناشتا بودن ندارد. با این حال، انجام این آزمایش در زمان مناسب

و با رعایت شرایط توصیه‌شده از سوی پزشک، می‌تواند نتایج دقیق‌تری داشته باشد. علاوه بر این، انتخاب نوع آزمایش (کیفی یا کمی) به شرایط فرد و نیازهای پزشکی بستگی دارد.